

PRX-T₃₃（マッサージピール）治療同意書

- ① PRX-T₃₃ は TCA（トリクロロ酢酸）、低濃度過酸化水素、コウジ酸が配合された製剤です。
- ② TCA が真皮深くに浸透し、線維芽細胞を活性化させることによりコラーゲンが増生され、肌にハリや弾力をもたらしめます。また、コウジ酸のメラニン生成抑制作用によりシミやくすみを改善します。
- ③ 過酸化水素の働きにより、皮膚表面のピーリング作用が抑えられ、刺激感がほとんどなく、赤みや皮ムケなどが起こりにくいのが特徴です。
- ④ もし赤みが出現しても通常はすぐに治まりますが、数日後に薄皮が剥けることがあります。
- ⑤ 直径 1～2 mm の白い丘疹（白いブツブツ）が出現することがあります。症状は 1 時間ほどで改善しますが、薄皮が剥けることがあります。
- ⑥ 赤みや皮ムケが生じた場合は、保湿や紫外線予防を行い、必要に応じてステロイドなどの抗炎症剤を塗布します。
- ⑦ かさぶたができた場合は落屑するまで剥がさないでください。無理に剥がすと色素沈着や瘢痕の原因となることがあります。
- ⑧ 刺激に弱い目の周り（特に目尻）、小鼻、法令線付近、口周り（特に口角）、傷のある部位は肌の状態により治療を避ける場合があります。
- ⑨ 配合成分に対する過敏症、アルコール過敏症、妊娠、授乳中、重度の敏感肌、強い炎症（アトピー性皮膚炎やかぶれなど）、脂漏性皮膚炎の部位、ヘルペスの方は安全性の観点より治療が受けられません。
- ⑩ トレチノインや過酸化ベンゾイルを使用されている方は治療前後 2 週間の使用を控えて下さい。
- ⑪ 2-3 週間おきに 5 回の治療が 1 クールの目安です。1 ヶ月ほど肌を休ませた後、メンテナンスとして 1-2 ヶ月に 1 回の治療をお勧めします。
（肌の状態によりメンテナンス前にさらに 1 クールの治療をお勧めする場合があります）
- ⑫ お肌に異常がなければ、治療当日より洗顔やメイクが可能ですが、こすらないようにしてください。また、ホームケアとして保湿や紫外線予防（日焼け止め）、必要に応じて抗炎症剤を塗布してください。治療後は乾燥を伴うため、効果を高めるためにも保湿は入念に行ってください。

上記に関しましては一般的な内容であり、症状等により個人差がある旨、何卒ご理解ください。

上記の説明を受け、十分に理解し納得した上で、治療を受けることに同意いたします。

年 月 日

本人 氏名 _____

保護者※ 氏名 _____

（※治療を受ける者が未成年者の場合、保護者の欄に署名と捺印をお願い致します）